

【入院・外来】化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 ロンサーフ(TAS-102)+BEV

変更 (① / / ② / /)

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
アバスチン(BEV)	5 mg/kg	点滴	Day 1, 15

*ロンサーフ(TAS-102) 70mg/m² 5日間投与2日間休薬を2サイクル、その後14日間休薬

外来 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
		主管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	ルート確保
ア	:	主管	点滴	生理食塩液 アバスチン注	100mL 5mg/kg	1B mg	※初回90分 分
		主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			分

〈治療開始日〉 年 月 日

〈投与スケジュール〉 28日で1クール

Day	1	8	15	22
アバスチン	↓	休薬	↓	休薬

*ロンサーフ(TAS-102) 70mg/m²

5日間投与2日間休薬を2サイクル、その後14日間休薬

(Day1~Day5内服Day6、7休薬、Day8~Day12内服Day13~28休薬)

※ロンサーフ(TAS-102)の各投与量における1回分服用錠数組み合わせ

体表面積(m ²)	1日量	朝、夕食後の1回量(mg)、服用錠数組み合わせ例	
1.07未満	70mg	35mg	15mg 1T + 20mg 1T
1.07 ~ 1.23	80mg	40mg	20mg 2T
1.23 ~ 1.38	90mg	45mg	15mg 3T
1.38 ~ 1.53	100mg	50mg	15mg 2T + 20mg 1T
1.53 ~ 1.69	110mg	55mg	15mg 1T + 20mg 2T
1.69 ~ 1.84	120mg	60mg	20mg 3T
1.84 ~ 1.99	130mg	65mg	15mg 3T + 20mg 1T
1.99 ~ 2.15	140mg	70mg	15mg 2T + 20mg 2T
2.15以上	150mg	75mg	15mg 1T + 20mg 3T

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)
例) バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

【患者個別対応】(患者個人での注意事項)