

(入院・外来)化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

変更 (① / 、② /)

変更 (③ / 、④ /)

〈治療レジメン名〉Dose-Dense Weekly TC療法

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴	Day 1・8・15
カルボプラチン	6 AUC	点滴	Day 1

外来 科 主治医 ※6コースまで

患者名 様 ID: _____

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名 _____

【Day1】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	経口		イメンドカプセル	125mg	1C	
イ	:	経口		レスタミンコーワ錠(10mg)	50mg	5錠	
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	ルート確保
ウ	:	主管	点滴	アロキシ注バッグ(0.75mg)	50mL	1B	
	:			デキサート注	6.6mg	1V	
	:			ガスター注(20mg)	20mg	1A	30分
エ	:	主管	点滴	生理食塩液	250mL	1B	
	:			パクリタキセル	80mg/m ²	mg	60分
オ	:	主管	点滴	生理食塩液	500mL	mL	
	:			カルボプラチン	6 AUC	mg	120分
カ	:	主管	点滴	YDソリタT3号輸液	200mL	1B	30分
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			分

【Day8、15】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	経口		レスタミンコーワ錠(10mg)	50mg	5錠	
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	ルート確保
イ	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	
	:			デキサート注	6.6mg	1V	
	:			ガスター注(20mg)	20mg	1A	30分
ウ	:	主管	点滴	生理食塩液	250mL	1B	
	:			パクリタキセル	80mg/m ²	mg	60分
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			分

〈治療開始日〉 年 月 日 〈変更開始日〉① 年 月 日

〈変更開始日〉② 年 月 日 〈変更開始日〉③ 年 月 日

〈投与スケジュール〉 28日で1クール

Day	1	8	15	22
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	休薬

※6コースまで

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

- ・前投薬はパクリタキセル点滴開始30分前に行うこと
- ・イメドカプセルは化学療法の1時間～1時間30分前に服用
- ・レスタミンコーワ錠は、化学療法の30分前に服用
- ・バイタルチェック

- ・皮膚に薬剤が付着したときは流水で洗い流す

- ・点滴セットはNTG用輸液セットを使用

- ・治療終了後1時間経過観察

【患者個別対応】 あり・なし