

(入院・外来)化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 GEM+DTX療法

変更 (① / / ② / /)

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
GEM(ゲムシタビン)	900mg/m ²	点滴	Day 1. 8
DTX(ドセタキセル)	70mg/m ²	点滴	Day 8

外来 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名**【Day 1】**

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1 B	ルート確保
ア	:	主管	点滴	生理食塩液	100mL	1 B	30分
				デキサート注	6.6mg	1 V	
イ	:	主管	点滴	生理食塩液	100mL	1 B	30分
				ゲムシタビン注「NK」	900mg/m ²	mg	
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			

【Day 8】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	経口		レスタミンコーワ錠(10mg)	50mg	5錠	
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1 B	ルート確保
イ	:	主管	点滴	生理食塩液	100mL	1 B	30分
				デキサート注	6.6mg	1 A	
				ガスター注	20mg	1 V	
ウ	:	主管	点滴	生理食塩液	250mL	1 B	150分
				ドセタキセル注「ニプロ」	70mg/m ²	mg	
エ	:	主管	点滴	生理食塩液	100mL	1 B	30分
				ゲムシタビン注「NK」	900mg/m ²	mg	
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に用いた残り)			

〈治療開始日〉① 年 月 日 ② 年 月 日
 ③ 年 月 日 ④ 年 月 日

〈投与スケジュール〉 21日で1クール

Day	1	8	15
ゲムシタビン	↓	↓	休薬
ドセタキセル	休薬	↓	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

・レスタミンコーワ錠は、化学療法30分前に服用。

【患者個別対応】 あり ・ なし