(入院 • 外来) 化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 ボルテゾミブ単独療法

変更(① / 、② /)

パルナッミノ(ヘルツイト)			1.3IIIg/111			及じ	土	Dayr, 8, 1	0, 22
<u>外来</u>	科		<u>主</u>	台 <u>医</u>					
<u>患者名</u>			<u>様</u>		<u>ID :</u>				
<u>生年月日:(M</u>	1•T•S•H)年	月	日(歳)	<u>性另</u>	<u>l: 男</u> :	性・女性	
<u>身長</u>	<u>cm</u>	<u>体重</u>	kį	<u> </u>	<u>体表面積</u>	<u>m</u> ²		病名	

投与量

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
1 :			皮下注	生理食塩液	20mL	mL	
	-			ベルケイド注	1.3mg/m ²	mg	
	:	主管	点滴	生理食塩液(ルート確保に)			

 〈治療開始日〉
 年
 月
 日

 〈変更開始日〉①
 年
 月
 日

〈投与スケジュール〉 35日で1クール

Day	1	8	15	22	29
ベルケイド	\downarrow	↓	↓	↓	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して) 例)バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

・レナデックス錠4mg 錠を施行当日の朝に内服すること。

【患者個別対応】(患者個人での注意事項) 例)アレルギー、終了後の安静など