

(入院・外来) 化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 キイトルーダ単独療法

変更 (① / 、② /)

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
キイトルーダ注	200mg/Body	点滴静注	Day 1

外来 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1 B	ルート確保
ア	:	主管	点滴	生理食塩液 キイトルーダ注	100mL 200mg/Body	1 B 200mg	30分
	:	主管	点滴	生理食塩液 (ルート確保に用いた残り)			分

所要時間合計 35分

〈治療開始日〉 年 月 日

〈変更開始日〉① 年 月 日 〈変更開始日〉② 年 月 日

〈投与スケジュール〉 21日(3週)で1クール

Day	1	8	15
	↓	休薬	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

例) バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応 (Dr. コール前にする事)

- ・インラインフィルター (0.22 μ g) を使用すること。
- ・Grade2以上のインフュージョンリアクションが発現した場合は、次回投与1時間～2時間前にレスタミンコーワ錠10mg 5T、カロナール錠500mg 1Tまたは2Tを経口投与すること。

【患者個別対応】(患者個人での注意事項)

例) アレルギー、終了後の安静など